

慢性C型肝炎需積極治療：

感染C型肝炎病毒的患者可能演變成慢性C型肝炎，其症狀不明顯，不易察覺。但若不積極治療，就可能導致肝硬化，甚至可能引起肝癌！

醫病共享決策 輔助表


慢性C型肝炎 治療方式 怎麼選？



? 感染C肝會如何

慢性 C型肝炎		70~80% 感染C型肝炎的人， 會變成慢性C型肝炎
肝硬化		20~30% 慢性C型肝炎的人， 二、三十年後會演變成肝硬化
肝癌		每年約5% 慢性C型肝炎且有肝硬化的人， 會併發肝癌

台灣C型肝炎病毒基因型之盛行率



參考文獻：
財團法人肝病防治學術基金會/C肝治療手冊(2020.9)

請透過以下三個步驟來幫助您做決定：

<步驟一> 比較治療方式

C肝全口服藥物	艾百樂 (Maviret)	宜譜莎 (Epclusa)
對象	無肝硬化或肝硬化Child A 患者	所有慢性C型肝炎患者
療程	 8週 回診次數較少	12週 回診次數較多
服藥方式	服藥 一次3顆 與食物併服	服藥 一次1顆 飯前中後服用 
副作用	頭痛、疲倦	頭痛、疲倦、噁心
治癒率	90~95%以上	
健保給付條件	健保給付	
治療費用	藥費部分負擔200元	
禁忌	懷孕或授乳婦女禁用	

<步驟二> 了解您對c肝治療在意的程度？

考量因素	完全不重要	不重要	普通	重要	非常重要
肝硬化及肝癌風險	1	2	3	4	5
經濟考量	1	2	3	4	5
治療方便性	1	2	3	4	5
藥物副作用	1	2	3	4	5

<步驟三> 您對慢性c型肝炎的認知有多少？

對	錯	慢性C型肝炎有可能演變成肝硬化或肝癌
☐	☐	積極治療慢性 C 型肝炎可以預防肝硬化及肝癌的發生
☐	☐	全口服抗病毒藥物方便且療效佳

<步驟四> 您現在確認好治療方式了嗎？請☐勾選

- ☐ 治療1：艾百樂(Maviret)
☐ 治療2：宜譜莎(Epclusa)
☐ 目前無法決定
 ○ 再與醫師討論
 ○ 再與家人討論
 ○ 我想瞭解更多，我的問題：_____

完成以上分析評估後，請帶著這份結果與您的主治醫師討論。

病歷號：_____ 姓名：_____ 簽章：_____

日期：_____

衛教者簽名：_____ 家屬簽名：_____ 日期：_____